



LA TAILLE DES OLIVIERS

1/La taille

2/Les maladies

3/L'engrais et l'arrosage

1/ LA TAILLE

Il s'agit ici d'énoncer des principes généraux car il est difficile de donner des détails sur la façon de tailler l'olivier.

- Pas plus de 8 charpentières
- Enlever 30 à 40% de bois et feuillage à chaque taille ainsi que les gourmands
- Les branches qui remontent sont celles qui porteront les fruits. Celles qui descendent ont produit et ne produiront plus. Celles qui vont produire sont un peu plus claires.
- Il faut espacer le départ des rameaux sur la branche de 2 à 3 cm au minimum.
- Ne pas conserver une branche qui monte trop haut et la tailler de façon à privilégier le départ d'un rameau horizontal vers le nord.
- Il est recommandé de garder des branches à l'intérieur de l'olivier pour éviter les brûlures des charpentières.

2/ LES MALADIES

L'œil de paon

Il est dû à une trop forte humidité soit du fait de la pluie soit d'arrosages par aspersion. N'est pas dangereux pour l'arbre, il fait seulement tomber les feuilles.

Traiter à la bouillie bordelaise à la dose de 125g /10 litres

Un seul traitement après la taille. On peut exceptionnellement retraiter 1 mois après mais jamais en période de floraison. On peut également sulfater le sol sous l'olivier.

S'il y a apparition de l'œil de paon dans la saison on peut traiter fin novembre, début décembre.

La Cochenille

Ce parasite suce la sève et rejette un miellat d'aspect cotonneux qui se transforme en fumagine.

Il ressemble à une lentille.

Le traitement consiste à enlever les bestioles à la main. C'est efficace et écolo ! On peut également pulvériser une solution de « insegar » à la dose de 4gr/10l. Pratiquer une taille sévère et si le tronc est atteint et le badigeonner de savon noir.

La teigne

C'est une mouche qui pique le bourgeon floral et se repère comme la cochenille par le développement d'un produit cotonneux.

Le traitement est identique à celui de la cochenille.

La Mouche

Ce parasite pond sur les olives verte un œuf qui va se développer dans le fruit, se transformer en mouche qui sortira en perçant un trou 21 jours plus tard.

Le traitement consiste à pulvériser du « *rogor* » à la dose de 7.5 ml/10 litres d'eau. Le traitement est efficace 18 jours.

On traite quand il y a des vols de mouches

On peut les repérer en plaçant un piège à mouches sur la partie sud : s'il y en a plus de 5 il est nécessaire de traiter.

Le Neiroun

La pire chose, heureusement rare, qui puisse arriver car ce ver qui creuse les branches fait mourir l'arbre.

Traitement : il faut couper la ou les branches malades et les faire brûler.

On le repère par de la fine sciure qui sort d'un petit trou.

Cette maladie ne touche pas les arbres en bonne santé.

3/ ENGRAIS ET ARROSAGE

Mettre engrais en fin de floraison

Choisir un engrais riche en magnésium type « *perle de l'olivier* ».

Un apport en humus (fumier sec, biofertil etc.) à raison de 4 à 5 kg par pied soit seul, soit avec engrais mais dans ce cas, il faut mettre d'abord l'engrais ensuite la fumure et ceci, à l'aplomb de la pendaison (ramure) de l'olivier.

Cet apport d'humus se fera en février

Il est préférable de l'enfouir un peu, sinon arroser immédiatement et ceci dans les deux cas.

ARROSAGE : En règle générale peu souvent, mais abondamment à chaque fois : par exemple 40 litres par pied

Dans nos régions, très chaudes et sèches, un arrosage en mai si nécessaire et/ou en aout.